



[Home](#) | [Anestésicos e Agulha Gengival](#) | [Anestésico](#) | Anestésico Tópico Xylestesin 10% Spray - Cristália

Digite o que você procura...



Anestésico Tópico Xylestesin 10% Spray - Cristália

Cod. de Referência: 233445

Embalagem com 1 frasco de 50ml. Cloridrato de Lidocaína.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.

XYLESTESIN É UM MEDICAMENTO, SEU USO PODE TRAZER RISCOS, PROCURE UM MÉDICO OU UM FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. MEDICAMENTOS PODEM CAUSAR EFEITOS INDESEJADOS, EVITE A AUTOMEDICAÇÃO: INFORME-SE COM O FARMACÊUTICO.

Atenção: Venda restrita ao Cirurgião Dentista ou pessoa jurídica que preste serviço odontológico com devida inscrição no CRO.



Frete Grátis!

NAS COMPRAS ACIMA DE R\$100,00*
*Exceto para pedidos de toxina botulínica.



Pushnews

R\$114,02

Condições de Pagamento [+]

dental

QUANTIDADE:

1

**Comprar**

Digite o que você procura...

Calcular frete e prazo

O prazo de entrega inicia-se após a confirmação de pagamento.

Calcular Frete

Indicação

INDICAÇÃO:

O Xylestesin® (lidocaína) 10% Spray é indicado como anestésico tópico na prevenção da dor associada com:

Otorrinolaringologia

- Punções dos seios maxilares

-Anestesia da orofaringe para prevenir náuseas e vômitos durante instrumentação

Obstetrícia

Durante o estágio final do parto e antes da episiotomia e sutura perineal, como adjuvante no controle da dor.

Odontologia

Antes de injeções, impressões dentárias, radiografias, remoção de tártaro.

CONTRA-INDICAÇÃO:

Hipersensibilidade aos anestésicos locais do tipo amida ou aos outros componentes da fórmula.

Lidocaína não deve ser aplicado na laringe. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

CUIDADO E ADVERTÊNCIA:

Equipamento de ressuscitação, oxigênio e outros fármacos afins deverão estar disponíveis quando os anestésicos

locais do tipo amida forem administrados em membranas mucosas.

Lidocaína 10% spray deverá ser utilizado com extremo cuidado se houver infecção ou se a área da aplicação estiver

traumatizada, pois sob tais condições, há uma rápida absorção sistêmica.

Deve ser usada a dose mais baixa que resulte em anestesia efetiva, para evitar altos níveis séricos e efeitos adversos. A segurança e eficácia da lidocaína dependem da dose correta, da técnica, precauções adequadas e rapidez nas

emergências. Repetidas doses de lidocaína podem causar significativo aumento dos níveis sanguíneos devido à lenta



absorção do fármaco e seus metabólitos. A tolerância varia de acordo com o estado do paciente. A absorção através das mucosas e superfícies feridas é relativamente alta, especialmente na laringe e árvore brônquica. Lidocaína 10% spray não deve ser usado em balonetes (cuff) de tubos endotraqueais feitos de plástico. A lidocaína base, pode causar danos em contato com balonetes de PVC e não-PVC de tubos endotraqueais. Este dano é devido a como orifícios que podem causar vazamento, levando a perda de pressão do balonete. A absorção da lidocaína depende da vascularização local.

POSOLOGIA:

Digite o que você procura...

Em adulto, não se deve fazer mais de 20 nebulizações para se alcançar a anestesia desejada. O número de nebulizações depende da extensão da área a ser anestesiada.

Odontologia: 1 a 5 aplicações (10 a 50 mg).

Otorrinolaringologia: 3 aplicações para punção da cavidade maxilar (30 mg).

Durante o parto: até 20 aplicações (até 200 mg).

Durante instrumentação: até 20 aplicações (200 mg) para procedimentos orofaríngeos.

Para pequenos procedimentos, o medicamento deve ser administrado por não menos que 1 minuto.

Para grandes procedimentos, a duração da aplicação é de não mais que 5 minutos.

Cada nebulização libera 100 mg de spray que corresponde a 10 mg de lidocaína.

Uma vez que a absorção é variável e especialmente alta na traqueia e nos brônquios, a dose máxima recomendada varia

dependendo da área de aplicação.

Registro ANVISA: 1.0298.0357-010-8.

APRESENTAÇÃO:

Solução spray 100 mg/mL

Frasco nebulizador com 50 mL

COMPOSIÇÃO:

Cada mL contém:

lidocaína..... 100 mg

veículo q.s.p. 1,0 mL

Excipientes: sacarina sódica, edetato dissódico, propilenoglicol, aroma cereja/menta, álcool etílico e água purificada.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

A administração concomitante de depressores centrais pode causar efeito aditivo na depressão do SNC. O uso associado a antiarrítmicos, como pode aumentar os efeitos tóxicos da lidocaína.

Anticonvulsivos hidantoínicos aumentam os efeitos depressores cardíacos. Bloqueadores beta-adrenérgicos podem diminuir o metabolismo hepático, aumentando a toxicidade da lidocaína quando esta é administrada em doses altas e repetida por um longo período de tempo. A administração simultânea de cimetidina pode provocar diminuição da depuração hepática da lidocaína. A metoxamina prolonga a restrição da circulação e pode causar necrose. Deve-se ter precaução na administração de lidocaína com fármacos antiarrítmicos classe III (ex: amiodarona). Para mais informações e outras interações, vide a Bula.

REAÇÕES ADVERSAS:

- Reação comum (>1/100 e <1/10): Zumbido.
- Reação rara (>1/10.000 e <1.000): Reação alérgica ao fármaco, anafilaxia.
- Relatos isolados: Broncoespasmo, metemoglobinemia.



Efeitos adversos com frequência desconhecida: Porfiria aguda intermitente, miastenia grave, reação de hipersensibilidade.

Características

dental

Itens Inclusos

Este site utiliza cookies. Para saber mais [clique aqui](#).

Digite o que você procura...



PROCUROU E NÃO ACHOU? QUAL PRODUTO VOCÊ GOSTARIA DE VER NA DENTAL CREMER?

[Faça sua sugestão](#)

Visite nosso

Blog

Atendimento

0800 727 7565

Seg. a Sex. das 8h às 20h

Sáb. das 9h às 13h

Institucional

[Assistente Virtual](#)

[Dental Cremer Lovers](#)

[Catálogos de Marcas](#)

[iDoc](#)

[Nosso App](#)

[Sobre a Dental Cremer](#)

Ajuda

[Acompanhe seu Pedido](#)

[Atualizar Boleto](#)

[Política Comercial](#)

[Política de Privacidade](#)





Baixe nosso App

Digite o que você procura...



- - - - -

Cartão de Crédito

Parcele em até 12x sem juros

Boleto a prazo

Parcele em até 6x sem juros

Boleto à vista

Ganhe 3% de desconto

Copyright © 2021 - Copyright © 2019 - Todos os direitos reservados | www.dentalcremer.com.br | Dental Cremer Produtos Odontológicos S.A. | CNPJ: 14.190.675/0001-55 | Rua das Missões, 674 - 2º andar - Ponta Aguda - Blumenau - Santa Catarina - CEP 89051-001 | Autorizações de Funcionamento ANVISA - Medicamentos: 1.09.245-3, Produtos para Saúde (Correlatos): 8.08.576-8, 8.10.706-3, Saneantes Domissanitários: 3.05.135-4, Perfumes/Produtos de Higiene/Cosméticos: 2.06.387-3 | CNPJ: 14.190.675/0002-36 | Av. das Indústrias Antônio Conrado de Oliveira, 90 - Galpão 03 - Distrito Industrial - Itapeva - Minas Gerais - CEP 37655-000 - Farmacêutica responsável: Paola de Souza Foltran - CRF/MG nº 38.001 | CNPJ: 14.190.675/0003-17 | Av. das Indústrias Antônio Conrado de Oliveira, 90 - Galpão 04 - Distrito Industrial - Itapeva - Minas Gerais - CEP 37655-000 - Farmacêutico responsável: Diego Diônata da Rosa - CRF/MG nº 31666. Política de Privacidade e Segurança - Fotos meramente ilustrativas - Os preços e condições da loja virtual estão sujeitos a alterações. Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o do Carrinho de Compra.

