

**PanVel** +

O que você procura?



Demais estados



*Página inicial /
Medicamentos /
Outros / Anestésicos*

Xylestesin 10% Spray 50ml

(Código: 108047)

**-6%****FRETE
GRÁTIS**

R\$ 164,15

**R\$
154,30**6x de R\$ 25,72 sem
juros

-	QTDE 1	+
---	---------------	---

COMPRAR**COMPRAR E
ASSINAR**

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Conteúdo: spray

Princípio ativo:

cloridrato de

lidocaína

monoidratado +

hemitartarato de

epinefrina Dosagem:

50ml Fabricante: Gr



LER DESCRIÇÃO



RECEBA ESTE PRODUTO MENSALMENTE

Com a Assinatura Panvel você pode assinar e receber mensalmente seus produtos favoritos sem cobrança de taxas, além de garantir esse preço por mais tempo. (Saiba mais)

APROVEITE



XAROPE

120
ML

Vick Xarope 44E 120ML

R\$27,15

DOCES
MENTOLADOS

5

BALAS

Pastilha Vick Limao C/ 5 Avulso

R\$3,99

DOCES
MENTOLADOS

5

BALAS

Pastilha Vick Cereja C/ 5 Avuls

R\$3,99

ADVERTÊNCIA DE USO

A PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

DESCRIÇÃO

- Conteúdo: spray
- Princípio ativo: cloridrato de lidocaína monoidratado + hemitartrato de epinefrina
- Dosagem: 50ml
- Fabricante: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.

Composição

Lidocaína 100 mg

Veículo q.s.p. 1,0 mL

Excipientes: sacarina sódica, edetato dissódico, propilenoglicol, aroma cereja/menta, álcool etílico e água purificada.

Para que serve Xylestesin?

O Xylestesin® (lidocaína) 10% Spray é indicado como anestésico tópico na prevenção da dor associada com:

Otorrinolaringologia

Punções dos seios maxilares;

Anestesia da orofaringe para prevenir náuseas e vômitos durante instrumentação.

Obstetrícia

Durante o estágio final do parto e antes da episiotomia e sutura perineal, como adjuvante no controle da dor.

Odontologia

Antes de injeções, impressões dentárias, radiografias, remoção de tártaro.

Como Xylestesin funciona?

Lidocaína, na forma de spray, é destinado ao uso em mucosas e proporciona eficaz anestesia de superfície, que ocorre normalmente dentro de 1 a 5 minutos, dependendo da área de aplicação e persiste por aproximadamente 10 a 15 minutos.

Contraindicação

Hipersensibilidade aos anestésicos locais do tipo amida ou aos outros componentes da fórmula.

Lidocaína não deve ser aplicado na laringe.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Como usar

É desnecessário secar o local antes da aplicação.

Para utilizar a solução spray, basta orientar a cânula para a região a ser anestesiada e realizar uma leve pressão sobre o botão.

Aconselha-se, após o uso, retirar o botão com a cânula e conservá-los em solução alcoólica, de modo a evitar uma possível deposição de cristais.

Como para qualquer anestésico local, a eficácia e segurança da lidocaína depende da dose apropriada, técnica correta, precauções adequadas e prontidão para atendimento das emergências.

Lidocaína é destinado ao uso em mucosas e proporciona eficaz anestesia de superfície, que dura aproximadamente 10 a 15 minutos. A anestesia geralmente ocorre dentro de 1-5 minutos, dependendo da área de aplicação.

Cadastre-se

Fique por dentro de desconto, promoções e ofertas

OK

[Conheça nossa política de privacidade](#)

Compre pelo telefone



Porto Alegre e Região Metropolitana

3218.9000

São Paulo e Demais localidades

0800.642.9001



Precisa de ajuda ou quer
deixar seu elogio ou crítica?

0800.642.9001

Sobre a Panvel

[Quem Somos](#)

[Nossas Lojas](#)

[Panvel Bem Você](#)

[Programa Bem Panvel](#)

[Revista de Ofertas](#)

[Trabalhe Conosco](#)

[Relação com Investidores](#)

[Política de Privacidade](#)

[Desconto de Laboratório](#)

Serviços



[Panvel Clinic](#)

[Vacinas](#)

[Medicamentos Especiais](#)

[Central de Atendimento](#)

[Descarte de Medicamentos](#)

Dúvidas



[Formas de Pagamento](#)

[Prazo de Entrega](#)

[Trocas e Devoluções](#)

Redes Sociais



Acessibilidade



Formas de Pagamento:



Panvel Farmácias | Filial 31 – CNPJ 92.665.611/0101-30 | Av. Protásio Alves, 4194 subsolo – Petrópolis | Porto Alegre/RS | 91310-000 | Farmacêutico responsável: Isabel Cristina Cunha Dias | CRF/RS – 6792 | AFE – 7318170 | Horário de funcionamento: 24 horas | Tel (51) 3235.1127. Panvel Farmácias | Filial 464 – CNPJ 92.665.611/0270-24 | Av. Cavallhada, nº 3860 | Porto Alegre/RS | 91740-000 | Farmacêutico responsável: Mariana Cervo | CRF/RS – 535349 | AFE – 7421850 | Horário de funcionamento: Das 8hs às 22hs | Tel (51) 3086.4782. Panvel Farmácias | Filial 507 – CNPJ 92.665.611/0320-28 | Av. Marechal Floriano Peixoto, 2160 | Curitiba/PR | 91010-002 | Farmacêutico responsável: Andressa de Freitas Ludwig | CRF/PR – 19010 | AFE – 7410571 | Horário de funcionamento: Seg. a Sab. – Das 8hs às 23hs. Domingos e Feriados – Fechado | Tel (41) 3333.7233 Panvel. Farmácias | Filial 701 – CNPJ 92.665.611/0192-77 | Av. Cristóvão Colombo, 976/980, 564 e 572 | Porto Alegre/RS | 90560-001 | Farmacêutico responsável: Beatriz Zunara Rozales Slipacka | CRF/RS – 535349 | AFE – 7270467 | Horário de funcionamento: Das 8hs às 22hs | Tel (51) 3268.6122.

A Panvel segue as determinações da Anvisa. As informações contidas neste site não devem ser usadas para automedicação e não substituem, em hipótese alguma, as orientações dadas pelo profissional da área médica. Somente o médico está apto a diagnosticar qualquer problema de saúde e prescrever o tratamento adequado. Ao persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. O Grupo Dimed realiza o tratamento de seus dados pessoais de acordo com os princípios da boa-fé, finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade de dados, segurança, prevenção, não discriminação e, mais importante, transparência. Qualquer tratamento de dados pessoais, sensíveis ou não, realizado pelo Grupo Dimed* estará baseado em fundamento legal e se dará de forma adequada com a finalidade da sua coleta.

grupodimed

Copyright © 2017. Panvel Farmácias é uma empresa do Grupo Dimed.