



O que deseja encontrar?



Início > Medicamentos > Remédios > Controle De Peso > Cloridrato De Sibutramina Monoidratado 15mg 30 Cápsulas Ems Genérico

< Voltar

♥ Favoritar



CLORIDRATO DE SIBUTRAMINA MONOIDRATADO 15MG 30 CÁPSULAS EMS GENÉRICO

EMS

30 Cápsulas

CLORIDRATO DE SIBUTRAMINA MONOHIDRATADO

0 de (0)

**Venda sujeita a envio antecipado
e/ou retenção da receita médica original**

CLORIDRATO DE SIBUTRAMINA MONOIDRATADO 15MG É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE UM MÉDICO OU UM FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.

VENDA SÓ PRESCRIÇÃO MÉDICA. O ABUSO DESTES MEDICAMENTOS PODE CAUSAR DEPENDÊNCIA. MEDICAMENTO GENÉRICO – LEI N.º 9.787/99.

Vendido e entregue por Droga Raia

De **R\$ 88,23**

Por **R\$ 47,39**

Sobre o Produto

Para que serve o Cloridrato de Sibutramina Monoidratado?

O cloridrato de sibutramina monoidratado é indicado como terapia adjuvante como parte de um programa de gerenciamento de peso recomendado para pacientes com um índice de massa corpórea (IMC) maior ou igual a 30 kg/m2 .

Como tomar o Cloridrato de Sibutramina Monoidratado?

O cloridrato de sibutramina monoidratado deve ser utilizado apenas sob orientação médica. A dose inicial recomendada é de 1 cápsula de 10 mg por dia, administrada por via oral, ingerida pela manhã, com um pouco de líquido, antes ou após a alimentação.

Caso não ocorra perda de pelo menos 2 kg nas primeiras 4 semanas de tratamento, o médico deve reavaliar o tratamento, que pode incluir um aumento da dose para 15 mg ou a suspensão do tratamento com sibutramina.

O tratamento deve ser suspenso em pacientes que não apresentarem perda de pelo menos 2 kg após 4 semanas de tratamento com a dose de 15 mg/dia.

Sempre que houver mudança na dose proposta para o tratamento, deve-se ter atenção para o controle da frequência cardíaca e da pressão arterial. Caso ocorra elevação de pressão arterial ou da frequência cardíaca, o médico deverá ser avisado.

Doses acima de 15 mg ao dia não são recomendadas.

A sibutramina deve ser administrada por período de até 2 anos.

Comprar

 01 Item

Adicionado à sua cesta

Finalizar compra

Em pacientes com doenças associadas à obesidade, é recomendado que o tratamento com sibutramina somente seja mantido se a perda de peso gerada pelo medicamento estiver associada a outros benefícios clínicos.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

Quando não devo usar o Cloridrato de Sibutramina Monoidratado?

O cloridrato de sibutramina monoidratado é contraindicado para uso por:

- Pacientes com histórico de diabetes mellitus tipo 2 com pelo menos 1 outro fator de risco, isto é, hipertensão (pressão alta) controlada por medicação, dislipidemia (aumento dos níveis de colesterol e/ou triglicérides), prática atual do tabagismo ou nefropatia diabética com evidência de microalbuminúria (perda anormal de proteína pelos rins);
- Pacientes com história de doença arterial coronariana (angina, história de infarto do miocárdio), insuficiência cardíaca congestiva, taquicardia (aumento da frequência cardíaca), doença arterial obstrutiva periférica, arritmia ou doença cerebrovascular (acidente vascular cerebral ou ataque isquêmico transitório);
- Pacientes com hipertensão (pressão alta) controlada inadequadamente (> 145/90 mmHg) (ver “O que devo saber antes de usar este medicamento?”);
- Pacientes com história ou presença de transtornos alimentares, como bulimia (tipo de compulsão alimentar associada a comportamento anormal em relação à ingestão de alimentos) e anorexia (redução na ingestão alimentar causada por transtorno de percepção do próprio peso);
- Pacientes recebendo outros medicamentos de ação central para a redução de peso ou tratamento de transtornos psiquiátricos;
- Pacientes recebendo inibidores da monoaminooxidase. É recomendado um intervalo de pelo menos duas semanas após a interrupção dos IMAOs antes de iniciar o tratamento com sibutramina (ver “O que devo saber antes de usar este medicamento?”).

O cloridrato de sibutramina monoidratado é contraindicado a pacientes com índice de massa corpórea (IMC) menor que 30 kg/m2 .

Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes alérgicos à sibutramina ou a qualquer outro componente da fórmula.

Este medicamento é contraindicado para uso por crianças, adolescentes e idosos acima de 65 anos.

CLORIDRATO DE SIBUTRAMINA MONOIDRATADO 15MG É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE UM MÉDICO OU UM FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.

Características

SKU	46336
EAN	7896004721125
Peso (kg)	0.0300
Quantidade	30 Cápsulas
Marca	EMS
Fabricante	EMS
Link Bula	Leia a bula
MS	1023508840036
Princípio Ativo Novo	CLORIDRATO DE SIBUTRAMINA MONOHIDRATADO
Dosagem	15mg

Quem comprou este produto se interessou também por

01 Item

Adicionado à sua cesta

Sabonete Líquido Dermatológico Darrow Suavié Pele ...

Suavié

60ml

0 de 5

(0)

Os produtos mais vistos desta categoria são

Tylenol Paracetamol 500mg 20 Comprimidos

Tylenol

20 Comprimidos Revestidos

0 de 5

(0)

Mais populares da categoria

01 Item
Adicionado à sua cesta

Sensor FreeStyle Libre - 1 Unidade

FreeStyle

1 Unidade

0 de 5 (0)



Veja avaliações de quem já comprou

As avaliações são coletadas por e-mail após a entrega do produto e auditadas pela Trustvox que certifica que as opiniões são reais.



Central de Atendimento

3003-7242

Horário de atendimento das 7h às 21h, de segunda a domingo.



Televendas

3003-7242

Horário de atendimento das 7h às 21h, de segunda a domingo.

Privacidade de dados

Como protegemos seus dados
Política de Privacidade
Portal do Titular dos Dados

A Droga Raia segue as determinações da

